


**Как известно, печень является жизненно важным органом и участвует в образовании крови, выработке желчи, а также нейтрализует вредные вещества, которые попадают в организм человека из окружающей среды. Основным заболеванием печени является гепатит. Гепатит имеет несколько видов: А, В, С, D, G, E.**

**Гепатит D** появляется у человека, когда его печень поражает вирус гепатита D. Однако, возбудитель этого заболевания не может сам развиваться в организме человека. Ему необходим помощник-вирус, который и поможет ему в развитии. Таким вирусом-помощником для данного вируса является вирус гепатита В. Сочетание данных вирусов может вызвать у человека очень тяжелое заболевание, которое может привести к довольно серьезным последствиям.



Заражение возбудителем вируса гепатита D может произойти при переливании человеку крови, которая заражена этим возбудителем. Также можно заразиться через использованные шприцы. В основном таким способом могут заразиться наркоманы. Возбудитель гепатита D может попасть внутри утробно от матери к плоду. Как говорят медицинские работники, все люди, которые инфицированы вирусом гепатита В, очень восприимчивы к вирусу гепатита D.

**Есть такие ситуации, при которых чаще всего и происходит заражение вирусом, который и вызывает заболевание гепатит D:**

переливание донорской крови. В этом случае вирус может попасть через кровь. Некоторые доноры являются носителями данного заболевания. Сейчас кровь тщательно проверяется на этот вирус специальными препаратами. Этот вирус может попасть в организм человека не только через кровь, но также при переливании ее препаратов; использование одного шприца для инъекций также может привести к инфицированию вирусом гепатитов D или В;

вирусы всех видов **гепатита** могут также передаваться и при половом контакте. В основном чаще всего таким способом можно инфицироваться вирусом гепатита В; заражение плода внутри утробно от матери встречается редко. Это бывает тогда, когда заболевание у матери находится в активной форме или женщина во время беременности перенесла острый гепатит. В этом случае тоже может произойти заражение вирусом плода. При кормлении грудью с молоком матери вирус не передается;

вирусы гепатитов В и D могут передаваться и тогда, если человек делает татуировки или другие прокалывания нестерильными иглами.

Бывают случаи, когда человек заражается одновременно вирусами **гепатитов D и В**. Инкубационный период длится от 1,5 месяцев до полугода. При такой форме заражения заболевание протекает очень тяжело и порой приводит к циррозу печени. В некоторых случаях медицинские работники не могут сразу поставить правильный диагноз. Такое сочетание вирусов, может привести к смертельному исходу.

Для того, чтобы назначить лечение, необходимо пройти обследование. Теми больными,

у которых острая форма заболевания, занимается врач-инфекционист, а при хронических формах заболевания - гепатолог или гастроэнтеролог. При диагностике заболевания больной должен находиться в стационаре. Ему назначают лабораторные исследования, при помощи которых и ставится диагноз и назначается соответствующее лечение.